



জাত পরিচিতি

বিআর২২-এর মতই বিআর২৩ (দিশারী) একটি নাবী আমন ধানের জাত। অর্থাৎ বন্যা-পরবর্তী রোপণ উপযোগী আলোক সংবেদনশীল জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৮ সালে এ জাত উদ্ভাবন করে। তবে আলোক সংবেদনশীল বিধায় এর জীবনকাল বপন ও রোপণ সময়ের উপর নির্ভরশীল।



বিআর২৩

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এর উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার।
- এটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত।
- এর চাল লম্বা, চিকন ও সাদা।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের আবাদী জমির প্রায় অর্ধেকই বন্যাগ্রবণ এবং কোন কোন ব্যতিক্রমী বছরে ৬০% -এরও বেশী এলাকা বন্যা কবলিত হতে পারে। সাধারণত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে আমন মৌসুমে বন্যা দেখা দেয় এবং ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়। আমন ধানের জমির প্রায় ২২% বন্যাগ্রবণ এলাকায়। এসকল এলাকায় বিআর২২ (কিরণ), নাইজারশাইল ও বিনাশাইল ধানের মতই বিআর২৩ নাবী আমন হিসাবে চাষ করার উপযোগী। এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জাতটি বেশ জনপ্রিয় এবং জোয়ারভাটা কবলিত অঞ্চলেও নাবী রোপা আমন হিসাবে চাষযোগ্য।

জীবনকাল

এর জীবনকাল ১৫০ দিন।

ফলন

বিআর২৩-এর ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৫ টন।



চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজতলায় বীজ বপন : আষাঢ় - শ্রাবণ, তবে নাবী: শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত (১৫ জুন-১৫ আগস্ট)।
২. চারার বয়স : ৩০-৫০ দিন (নাবী রোপণের ক্ষেত্রে চারার বয়স বেশী হওয়া আবশ্যিক)।
৩. রোপণের সময় : স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রাবণ-ভাদ্র (নাবী: আশ্বিনের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ১৫-৩০ পর্যন্ত)।
৪. রোপণ দূরত্ব : ২৫ X ১৫ সেন্টিমিটার।
৫. চারা রোপণ : নাবী রোপণের ক্ষেত্রে একটু বেশী বয়সের চারা ঘন করে লাগাতে হবে।
৬. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২৪	১৩	৯	৮	১.৫

৬.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।
৭. সেচ ব্যবস্থাপনা : চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।
৮. আগাছা দমন : রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৯. রোগবালাই দমন : অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য।
১০. ফসল কাটা : অগ্রহায়ণ মাস (১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brii.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যাঙ্ক শীট ৩৪